

2024秋季学期线性代数期末考试（回忆版）

回忆整理：[24学术讨论群](#) [[syhanjin](#) 老汉 离谱 潜伏 浮萍 东墙 天赐 [卡基米](#) 黄鹂 Yasumi Speculator Schwarz Fun10165 Jaaack]

一、填空题

1.
$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 点 $(2, 0, 1)^T$ 到平面 $5x + 3y - 4z + 4 = 0$ 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 三阶方阵 \mathbf{A} 的特征值是 $1, -1, \frac{1}{5}$, \mathbf{B} 与 \mathbf{A} 相似, $|\mathbf{B}^{-1} - 2\mathbf{E}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 过曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 且母线平行于 y 轴的柱面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. \mathbf{A} 是一个二阶方阵, 其中 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、单选题

1. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的解, $R(\mathbf{A}) = 2$, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 0, 2)^T, \alpha_2 + 2\alpha_3 = (4, 5, 5)^T$, 则 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的通解为 ().

(A). $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$ (B). $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

(C). $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$ (D). 不重要

2. \mathbf{A} 为正定矩阵, 下列说法错误的是 ().

(A). \mathbf{A} 可逆 (B). $k\mathbf{A}$ 也为正定矩阵 ($k \in \mathbb{R}$) (C). \mathbf{A} 为实对称矩阵 (D). \mathbf{A}^k 为正定矩阵

3. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 则 ().

(A). \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 相似且合同 (B). \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 相似不合同

(C). \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 合同不相似 (D). \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 既不相似也不合同

4. 直线 $L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$, 与直线 $L_2: \begin{cases} x = a_3 + a_2t \\ y = b_3 + b_2t \\ z = c_3 + c_2t \end{cases}$ 相交, $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T$, 则线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \alpha_3$ 解的情况为 ().

(A). 有唯一解 (B). 有无数解 (C). 无解 (D). 不确定

5. (数据是编的) 甲、乙二人约定用矩阵乘法对通讯信息进行加密. 用可逆矩阵 \mathbf{A} 左乘一个明文矩阵 \mathbf{B} 可得密文矩阵 \mathbf{C} . 接收方只要用 \mathbf{A}^{-1} 左乘密文矩阵就可以得到明文矩阵. 现有一条信息, 其明文矩阵 \mathbf{B} 和密文矩阵 \mathbf{C} 分别为: $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 6 & 19 & 7 & 4 \\ 17 & 50 & 19 & 11 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, 则明文矩阵 \mathbf{B} 为 ().

$$(A). \begin{pmatrix} 1 & -7 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (B). \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (C). \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 1 \\ 4 & -5 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (D). \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

三、多选题

1. $\mathbf{A}\mathbf{X}_i = \lambda_i\mathbf{X}_i, i = 1, 2, 3$, 下列说法错误的是

(A). $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ 线性无关

(B). 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 都不相等, 则 \mathbf{A} 可以相似对角化

(C). 若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, 则 \mathbf{A} 不可相似对角化

(D). 若 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$, 则 \mathbf{A} 的全部特征向量为 $k_1\mathbf{X}_1 + k_2\mathbf{X}_2, k_3\mathbf{X}_3, k_1, k_2$ 不全为零, $k_3 \neq 0$

2. 下列说法错误的是

(A). $r \leq s$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 不能线性表示向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$

(B). β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r, k_1, k_2, \dots, k_r$ 不全为零

(C). 矩阵 \mathbf{A} 与矩阵 \mathbf{B} 等价, 则 \mathbf{A} 的列向量组与 \mathbf{B} 的列向量组等价

(D). 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 两两正交, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 \mathbf{R}^n 的一组基

四、 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 为线性空间 V 的一组基

(1). γ_1, γ_2 为 V 的标准正交基, $\gamma_1 = \frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}$, 求 γ_2

(2). 求基 α_1, α_2 到 (1) 中所求标准正交基的过渡矩阵

五、已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 6 & -2 \end{pmatrix}$, 矩阵 \mathbf{X} 满足 $\mathbf{A}\mathbf{X} = 2\mathbf{E} - \mathbf{X}$, 求 \mathbf{X} .

六、讨论线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ \quad \quad \quad + x_2 + ax_3 = 2 \\ x_1 + ax_2 \quad \quad = b \end{cases}$ 何时无解, 何时有一解, 何时有无数解, 有无数解时写出其通解

七、二次型 $f = \mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$, \mathbf{A} 每行数之和为 2, $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个解为 $(1, 0, -1)^T$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = 8$

- (1). 求 \mathbf{A} 的全部特征值
- (2). 求正交线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ 化 f 为标准型
- (3). 求 \mathbf{A}

八、以下结论是否正确，正确的给出证明，错误的说明理由

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1) & (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2) & \cdots & (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_m) \\ (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1) & (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2) & \cdots & (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_1) & (\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_2) & \cdots & (\boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_m) \end{pmatrix}$$

- (1). $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关，则 $|\mathbf{A}| = 0$.
- (2). $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，则 $|\mathbf{A}| > 0$.