

习题三

1. 沿下列路径计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$ 。

(1) 自原点到 $3+i$ 的直线段；

(2) 自原点沿实轴至 3 ，再由 3 垂直向上至 $3+i$ 。

(3) 自原点沿虚轴至 i ，再由 i 水平向右至 $3+i$ 。

解： (1) $\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^1 t^2 (3+i) dt = \frac{1}{3}(3+i)^3$ 。

(2) $\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^3 x^2 dx + \int_0^1 (3+iy)^2 idy = \frac{1}{3}(3+i)^3$ 。

(3) $\int_0^{3+i} z^2 dz = \int_0^1 (iy)^2 idy + \int_0^3 (x+i)^2 dx = \frac{1}{3}(3+i)^3$ 。


2. 分别沿 $y=x$ 与 $y=x^2$ 算出积分 $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz$ 的值。

解： (1) $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz = \int_0^1 (x^2 + ix)(1+i) dx = (1+i) \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}i \right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$ 。

(2) $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz = \int_0^1 (x^2 + ix^2)(1+2xi) dx = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$ 。

3. 计算下列积分。

(1) $\oint_C |z| \bar{z} dz$ ，其中 C 是一条闭曲线，由直线段： $-1 \leq x \leq 1, y=0$ 与上半单位圆周组成，取逆时针方向。



解： $\oint_C |z| \bar{z} dz = \int_0^\pi 1 \cdot e^{-i\theta} \cdot ie^{i\theta} d\theta + \int_{-1}^1 |x| x dx$

$$= \pi i。$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z}; \oint_{|z|=1} \frac{dz}{|z|}; \oint_{|z|=1} \frac{ds}{z}; \oint_{|z|=1} \frac{ds}{|z|}。$$

解: $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\theta} d\theta}{e^{i\theta}} = 2\pi i。$

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{|z|} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{i\theta} d\theta}{|e^{i\theta}|} = \int_0^{2\pi} ie^{i\theta} d\theta = 0。$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{ds}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{e^{i\theta}} = 0。$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{ds}{|z|} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1} = 2\pi。$$

(3) $\int_{1-i}^{3+2i} (2z^2 - 5z + 1) dz$, 积分曲线是由 $1-i$ 到 $3+2i$ 的直线段。

解: $\int_{1-i}^{3+2i} (2z^2 - 5z + 1) dz = \left(\frac{2}{3} z^3 - \frac{5}{2} z^2 + z \right) \Big|_{1-i}^{3+2i} = -\frac{91}{6} - 48i。$

(4) $\int_{-1}^i \frac{1}{z^2 + z - 2} dz$, 积分曲线是由 -1 到 i 的直线段。

解: $\int_{-1}^i \frac{1}{z^2 + z - 2} dz = \frac{1}{3} \int_{-1}^i \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+2} \right) dz = \frac{1}{3} [\ln(z-1) - \ln(z+2)] \Big|_{-1}^i$

$$= \frac{1}{3} [\ln(i-1) - \ln(-1-1) - \ln(i+2) + \ln(-1+2)]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} [\ln(i-1) - \ln(-2) - \ln(i+2)] \\
&= \frac{1}{3} \left[\ln\sqrt{2} + i\frac{3\pi}{4} - \ln 2 - i\pi - \ln\sqrt{5} - i\arctan\frac{1}{2} \right] \\
&= \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{2}\ln 10 + i \left(-\frac{\pi}{4} - \arctan\frac{1}{2} \right) \right].
\end{aligned}$$

4. 是否有等式 $\operatorname{Re}\left(\int_C f(z) dz\right) = \int_C \operatorname{Re}[f(z)] dz$?

解: 一般不成立, 例如 $f(z) = z$, $C: z = it, 0 \leq t \leq 1$ 。有

$$\operatorname{Re}\left(\int_C f(z) dz\right) = \operatorname{Re}\left(\int_0^1 it \cdot i dt\right) = -\frac{1}{2}。$$

$$\int_C \operatorname{Re}[f(z)] dz = \int_C \operatorname{Re}(it) dz = 0。$$

可见

$$\operatorname{Re}\left(\int_C f(z) dz\right) \neq \int_C \operatorname{Re}[f(z)] dz。$$


5. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内除 z_0 外处处解析, 且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = M \quad (M \in \mathbb{C}),$$

则对于任一属于 D 且围绕 z_0 的简单光滑闭曲线 C , 恒有

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = M。$$

证: 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内除 z_0



外处处解析, 且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = M \quad (M \in \mathbb{C})。$$

于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$

时, 有

$$|(z - z_0) f(z) - M| < \varepsilon。 \quad (*)$$

对于任一属于 D 且围绕 z_0 的简单光滑闭曲线 C , 在 C 内作圆周

$$K_r: |z - z_0| = r,$$

使得 $r < \delta$ 。由复合闭路定理及 $(*)$, 得

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz - M \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_r} f(z) dz - M \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_r} f(z) dz - M \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_r} \frac{1}{z - z_0} dz \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_r} \frac{(z - z_0) f(z) - M}{z - z_0} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{K_r} \frac{|(z - z_0) f(z) - M|}{|z - z_0|} dS \\ &< \frac{1}{2\pi} \cdot \varepsilon \cdot \oint_{K_r} \frac{1}{r} dS \\ &= \varepsilon。 \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 知

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = M。$$

6. 设 $f(z) = \oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$, 求 $f'(1+i)$, $f(3(1+i))$ 。

解: $f(z) = \oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$

$$= \begin{cases} 2\pi i(3z^2 + 7z + 1), & |z| < 3; \\ 0, & |z| > 3. \end{cases}$$

故

$$f'(1+i) = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1)' \Big|_{z=1+i} = 2\pi i[6(1+i) + 7] = 2\pi i(13 + 6i).$$

$$f(3(1+i)) = 0.$$

7. 直接得出下列积分的结果, 并说明理由。

(1) $\oint_{|z|=1} \frac{3z+5}{z^2+2z+4} dz;$

解: $z^2 + 2z + 4$ 的零点 $-1 \pm i\sqrt{3}$ 在 $|z| \leq 1$ 外, 故函数 $f(z) = \frac{3z+5}{z^2+2z+4}$ 在 $|z| \leq 1$ 处处解析。由柯西积分定理, 知

$$\oint_{|z|=1} \frac{3z+5}{z^2+2z+4} dz = 0.$$

(2) $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{\cos z} dz;$

解: 注意到 $\cos z = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = 0 \Leftrightarrow e^{i2z} = -1 \Leftrightarrow z = z_k = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。

但是 $|z_k| > 1$ 。故函数 $f(z) = \frac{e^z}{\cos z}$ 在 $|z| \leq 1$ 处处解析。由柯西积分定理,

知

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{\cos z} dz = 0.$$

8. 沿指定闭曲线的正向计算下列各积分。

$$(1) \oint_C \frac{e^z}{z-2} dz, C: |z-2|=1;$$

$$\text{解: } \oint_{|z-2|=1} \frac{e^z}{z-2} dz = 2\pi i e^z \Big|_{z=2} = 2\pi e^2 i.$$

$$(2) \oint_C \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2} dz, C: |z|=2;$$

$$\text{解: } \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2} dz = 2\pi i (\sin z)' \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

$$(3) \oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)}, C: |z| = \frac{3}{2};$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{4}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} + \oint_{|z+i|=\frac{1}{4}} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} \\ &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{dz}{(z+i)(z^2+4)}}{z-i} + \oint_{|z+i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{dz}{(z-i)(z^2+4)}}{z+i} \end{aligned}$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \right]_{z=i} + 2\pi i \left[\frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \right]_{z=-i}$$

$$= 0。$$

(4) $\oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3} dz$, 其中 a 为 $|a| \neq 1$ 的任何复数, $C: |z|=1$;

解: 当 $|a| < 1$ 时, 有

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{(z-a)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (e^z)'' \Big|_{z=a} = \pi e^a i。$$

当 $|a| > 1$ 时, 有

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{(z-a)^3} dz = 0。$$

(5) $\oint_C \frac{3z+2}{z^4-1} dz$, $C: |z-(1+i)| = \sqrt{2}$ 。

解: 注意到 $z^4 - 1 = 0 \Leftrightarrow z = \pm 1, \pm i$ 。这些零点仅 $z=1$ 和 $z=i$ 在 C 内。

故

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{3z+2}{z^4-1} dz &= \oint_{|z-1|=0.1} \frac{3z+2}{z^4-1} dz + \oint_{|z-i|=0.1} \frac{3z+2}{z^4-1} dz \\ &= \oint_{|z-1|=0.1} \frac{\frac{3z+2}{(z+1)(z^2+1)}}{z-1} dz + \oint_{|z-i|=0.1} \frac{\frac{3z+2}{(z+i)(z^2-1)}}{z-i} dz \\ &= 2\pi i \left(\frac{3+2}{(1+1)(1^2+1)} + \frac{3i+2}{(i+i)(i^2-1)} \right) = \pi i(1+i) = \pi(-1+i)。 \end{aligned}$$

9. 计算积分 $\oint_C \frac{dz}{z+2}$, 其中 C 是圆周 $|z|=1$ 正向, 并由此证明:

$$\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = 0.$$

解: 函数 $f(z) = \frac{1}{z+2}$ 在 $|z| \leq 1$ 解析, 故

$$\oint_C \frac{dz}{z+2} = 0.$$

另一方面, 将圆周 $|z|=1$ 正向写成参数方程 $z = e^{i\theta}$, $-\pi \leq \theta \leq \pi$, 有

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z+2} &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{i\theta} i d\theta}{e^{i\theta} + 2} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(-\sin\theta + i\cos\theta)}{(\cos\theta + 2) + i\sin\theta} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(-\sin\theta + i\cos\theta)[(\cos\theta + 2) - i\sin\theta]}{[(\cos\theta + 2) + i\sin\theta][(\cos\theta + 2) - i\sin\theta]} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{-\sin\theta(\cos\theta + 2) + \cos\theta\sin\theta + i[(\cos\theta + 2)\cos\theta + \sin^2\theta]}{5 + 4\cos\theta} d\theta \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{i[(\cos\theta + 2)\cos\theta + \sin^2\theta]}{5 + 4\cos\theta} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \frac{i(1 + 2\cos\theta)}{5 + 4\cos\theta} d\theta. \end{aligned}$$

因此, 有

$$\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = 0.$$

10. 如果多项式 $Q(z)$ 比多项式 $P(z)$ 的次数至少高 2 次, 证明:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{|z|=R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0.$$

证：设 $\frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}$, $a_n \neq 0, b_m \neq 0, m-n \geq 2$ 。于是，

有

$$\begin{aligned} \left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| &= \left| \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0} \right| \\ &= \frac{1}{|z|^{m-n}} \frac{\left| a_n + a_{n-1} \frac{1}{z} + \cdots + a_1 \frac{1}{z^{n-1}} + a_0 \frac{1}{z^n} \right|}{\left| b_m + b_{m-1} \frac{1}{z} + \cdots + b_1 \frac{1}{z^{m-1}} + b_0 \frac{1}{z^m} \right|} \\ &\leq \frac{1}{|z|^{m-n}} \frac{|a_n| + \left| a_{n-1} \frac{1}{z} + \cdots + a_1 \frac{1}{z^{n-1}} + a_0 \frac{1}{z^n} \right|}{\left| b_m \right| - \left| b_{m-1} \frac{1}{z} + \cdots + b_1 \frac{1}{z^{m-1}} + b_0 \frac{1}{z^m} \right|}. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} \left| a_{n-1} \frac{1}{z} + \cdots + a_1 \frac{1}{z^{n-1}} + a_0 \frac{1}{z^n} \right| &= 0, \\ \lim_{z \rightarrow \infty} \left| b_{m-1} \frac{1}{z} + \cdots + b_1 \frac{1}{z^{m-1}} + b_0 \frac{1}{z^m} \right| &= 0. \end{aligned}$$

从而，当 $R=|z|$ 充分大以后，有

$$\begin{aligned} \left| a_{n-1} \frac{1}{z} + \cdots + a_1 \frac{1}{z^{n-1}} + a_0 \frac{1}{z^n} \right| &< \frac{|a_n|}{2}, \\ \left| b_{m-1} \frac{1}{z} + \cdots + b_1 \frac{1}{z^{m-1}} + b_0 \frac{1}{z^m} \right| &< \frac{|b_m|}{2}. \end{aligned}$$

于是

$$\left| \oint_{|z|=R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz \right| \leq \oint_{|z|=R} \left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| dS < \oint_{|z|=R} \frac{1}{R^{m-n}} \frac{|a_n| + \frac{|a_n|}{2}}{|b_m| - \frac{|b_m|}{2}} dS$$

$$= \frac{1}{R^{m-n}} \frac{3|a_n|}{2|b_m|} 2\pi R = \frac{1}{R^{m-n-1}} \frac{6\pi|a_n|}{|b_m|} < \frac{1}{R} \frac{6\pi|a_n|}{|b_m|} \rightarrow 0, R \rightarrow \infty.$$

即

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{|z|=R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0.$$

11. 设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向的简单光滑闭曲线, 它的内部含于 D 。如果 $f(z) = g(z)$ 在 C 上所有点都成立。证明在 C 的内部所有点处 $f(z) = g(z)$ 也成立。

证: 设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向的简单光滑闭曲线, 它的内部含于 D 。于是, $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 C 上及 C 内处处解析。由柯西积分公式, 在 C 的内部点 z 处, 如果 $f(\zeta) = g(\zeta)$ 在 C 上所有点 ζ 都成立, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = g(z).$$

12. 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除去点 z_0 外处处解析, 又设

$$g(z) = (z - z_0)^n f(z) \quad (z \neq z_0), \quad n = 1, 2, \dots.$$

若函数 $g(z)$ 在区域 D 内解析。对于 D 内任一条围绕 z_0 的正向的简单光滑闭曲线 C , 证明:

$$\oint_C f(z) dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} g^{(n-1)}(z_0).$$

证: 由解析函数的高阶导数公式, 有

$$g^{(n-1)}(z_0) = \frac{(n-1)!}{2\pi i} \oint_C \frac{g(z)}{(z-z_0)^n} dz = \frac{(n-1)!}{2\pi i} \oint_C f(z) dz。$$

故

$$\oint_C f(z) dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} g^{(n-1)}(z_0)。$$

13. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, 且不为零, C 为 D 内任一条正向的简单光滑闭曲线。问: 积分 $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 是否为零? 为什么?

解: $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0。$

由于 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, 且不为零。故 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在单连通区域 D 内处处解析。对于 D 内任一条正向的简单光滑闭曲线 C , 由柯西积分定理, 有

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0。$$

14. 设函数 $f(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内解析, 且沿任何圆周 $|z|=r, 0 < r < 1$ 的积分为零, 那末 $f(z)$ 是否比须在 $z=0$ 解析? 肯定请给出证明, 否定请举出反例。

解: 否定。

如函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $0 < |z| < 1$ 内解析, 且沿任何圆周 $|z|=r, 0 < r < 1$ 的积分为零, 但函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $z=0$ 处不解析。

15. 若函数 $f(z)$ 在 z 平面解析, 且有界, 则 $f(z)$ 一定恒为常数。

证: 由题设, $\exists M > 0$, 使

$$|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}。$$

$\forall z_0 \in \mathbb{C}$, 作以 z_0 为心, 任意正数 r 为半径的正向圆周 Γ_r 。由解析函数的导数公式, 有

$$\begin{aligned} |f'(z)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_r} \frac{|f(z)|}{|z-z_0|^2} ds \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_r} \frac{M}{r^2} ds = \frac{M}{r}。 \end{aligned}$$

上式对 $\forall r > 0$ 均成立。于是令 $r \rightarrow \infty$, 有

$$f'(z_0) = 0。$$

由 z_0 的任意性, 知

$$f'(z) = 0, \forall z \in \mathbb{C}。$$

故

$$f(z) = \text{常数}, \forall z \in \mathbb{C}。$$

16. 设函数 $f(z)$ 在正向简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析, $z_0 \in D$,

证明

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz。$$

证: 设函数 $f(z)$ 在正向简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析, 则函数 $f'(z)$ 也在正向简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析。对于 $\forall z_0 \in D$, 由柯西积分公式, 有

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f'(z_0)。$$

再由高阶导数公式，得

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz = 2\pi i f'(z_0)。$$

可见

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz。$$

17. 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析，并且 $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ ，证明

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!(n+1)^{n+1}}{n^n}, \quad n=1, 2, \dots。$$

证： 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析，由高阶导数公式，得

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad 0 < r < 1。$$

取 $r = \frac{n}{n+1}$ ，注意到 $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ ，有

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(0)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=\frac{n}{n+1}} \left| \frac{f(z)}{z^{n+1}} \right| ds \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=\frac{n}{n+1}} \left| \frac{1}{1-\frac{n}{n+1}} \frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}} \right| ds \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n! (n+1)^{n+2}}{2\pi n^{n+1}} \oint_{|z|=\frac{n}{n+1}} ds \\
&= \frac{n! (n+1)^{n+2}}{2\pi n^{n+1}} 2\pi \frac{n}{n+1} = \frac{n!(n+1)^{n+1}}{n^n}, n=1,2,\dots.
\end{aligned}$$

18. 称 $P_n(z) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dz^n} (z^2 - 1)^n$ 是 Legendre 多项式。证明 Legendre 多项式有如下的积分表示

$$P_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(\zeta^2 - 1)^n}{2^n (\zeta - z)^{n+1}} d\zeta,$$

其中 C 是任意内部包含点 z 的简单闭曲线。

证：注意到函数 $f(z) = (z^2 - 1)^n$ 在 z 平面上处处解析，由高阶导数公式，有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(\zeta^2 - 1)^n}{2^n (\zeta - z)^{n+1}} d\zeta &= \frac{1}{2^n} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(\zeta^2 - 1)^n}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \\
&= \frac{1}{2^n} \frac{1}{2\pi i} \frac{2\pi i}{n!} \frac{d^n}{d\zeta^n} \left((\zeta^2 - 1)^n \right) \Big|_{\zeta=z} \\
&= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dz^n} (z^2 - 1)^n.
\end{aligned}$$

19. 设 C 为一内部包含实轴上线段 $[a, b]$ 的简单光滑闭曲线。函数 $f(z)$ 在 C 内及其上解析且在 $[a, b]$ 上取实值。证明对于任意两点 $z_1, z_2 \in [a, b]$,

总有点 $z_0 \in [a, b]$ 使

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz。$$

证: 设 C 为一内部包含实轴上线段 $[a, b]$ 的简单光滑闭曲线。函数 $f(z)$ 在 C 内及其上解析且在 $[a, b]$ 上取实值。对于任意两点 $z_1, z_2 \in [a, b]$, 在 C 内作两个分别包含 z_1 和 z_2 的小圆周 C_1 和 C_2 , 它们互不相交也互不包含。由复合闭路定理, 有

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz &= \oint_{C_1} \frac{f(z)}{z-z_1} dz + \oint_{C_2} \frac{f(z)}{z-z_2} dz \\ &= 2\pi i \left(\frac{f(z_1)}{z_1-z_2} + \frac{f(z_2)}{z_2-z_1} \right) \\ &= 2\pi i \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1}。 \end{aligned} \quad (1)$$

由于函数 $f(z)$ 在 C 内解析且在 $[a, b]$ 上取实值, 从而 $f(z)$ 在 $[a, b]$ 上可导。对于 $z_1, z_2 \in [a, b]$, 由数学分析中的 Lagrange 中值定理, $\exists z_0 \in [a, b]$, 使

$$f(z_2) - f(z_1) = f'(z_0)(z_2 - z_1)。 \quad (2)$$

再有柯西积分公式, 有

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz。 \quad (3)$$

结合(1),(2),(3), 得

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz。$$

20. 设函数 $f(z)$ 在圆周 $C: |z|=R(>0)$ 上及内部 D 处处解析, 对于任意的 $z \in D$, 证明

① 函数 $g(\zeta) = \frac{R^2 - z\bar{z}}{R^2 - \zeta\bar{z}} f(\zeta)$ 在 C 上及内部解析;

② $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{R^2 - z\bar{z}}{(\zeta - z)(R^2 - \zeta\bar{z})} f(\zeta) d\zeta$.

证: 设函数 $f(z)$ 在圆周 $C: |z|=R(>0)$ 上及内部 D 处处解析。对于给定的 $z \in D$, 及任意 ζ 在圆周 $C: |z|=R(>0)$ 上及内部 D , 由于 $R^2 - \zeta\bar{z} \neq 0$,

函数 $g(\zeta) = \frac{R^2 - z\bar{z}}{R^2 - \zeta\bar{z}} f(\zeta)$ 在 C 上及内部解析。再由柯西积分公式, 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{R^2 - z\bar{z}}{(\zeta - z)(R^2 - \zeta\bar{z})} f(\zeta) d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\frac{R^2 - z\bar{z}}{R^2 - \zeta\bar{z}} f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \left. \frac{R^2 - z\bar{z}}{R^2 - \zeta\bar{z}} f(\zeta) \right|_{\zeta=z} \\ &= f(z). \end{aligned}$$

21. 设函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析且不为常数, n 为正整数。

(1) 对于任意的 $z \in D$, 证明

$$[f(z)]^n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{[f(\zeta)]^n}{\zeta - z} d\zeta.$$

(2) 设 $M = \max_{\zeta \in C} \{|f(\zeta)|\}$, l 为 C 的长度, $d = \min_{\zeta \in C} \{|\zeta - z|\}$. 证明不等式

$$|f(z)| \leq M \left(\frac{l}{2\pi d} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

并进一步证明

$$|f(z)| \leq M, \quad z \in D.$$

证: 设函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析且不为常数, n 为正整数。从而函数 $[f(z)]^n$ 在简单闭曲线 C 上及内部 D 处处解析。

(1) 由柯西积分公式, 有

$$[f(z)]^n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{[f(\zeta)]^n}{\zeta - z} d\zeta.$$

(2) 利用(1), 得

$$\begin{aligned} |f(z)|^n &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|f(\zeta)|^n}{|\zeta - z|} dS \leq \frac{1}{2\pi} M^n \frac{1}{d} \oint_C dS \\ &= \frac{M^n l}{2\pi d}. \end{aligned}$$

从而, 有

$$|f(z)| \leq M \left(\frac{l}{2\pi d} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad n=1, 2, \dots.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$|f(z)| \leq M \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{l}{2\pi d} \right)^{\frac{1}{n}} = M \circ$$