

大学物理（王少杰教材）第 5 套阶段训练题目

近代物理（14 章 1-4 节）

一、填空题（共 30 分）

- 1.（本题 4 分）在加热黑体过程中，其最大单色辐出度（单色辐射本领）对应的波长由 0.8 m 变到 0.4 m，则其辐射出射度（总辐射本领）增大为原来的_____倍。
- 2.（本题 4 分）黑体温度 T 升高一倍，其辐射出射度增加_____倍。
- 3.（本题 4 分）在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片，其红限波长为 λ_0 。今用单色光照射，发现放出的电子（质量为 m ，电荷的绝对值为 e ）在垂直于磁场的平面内作圆周运动的最大半径为 R ，那么此照射光光子的能量是_____。
- 4.（本题 4 分）关于光电效应有下列说法：
 - (1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；
 - (2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率的光照射时，释出的光电子的最大初动能也不同；
 - (3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等；
 - (4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一倍时，该金属的饱和光电流也增大一倍。 其中正确的是_____。
- 5.（本题 4 分）当照射光的波长从 400 nm 变到 300 nm 时，光强不变，对同一金属，在光电效应实验中，波长变化后的截止电压与之前的截止电压之差为_____；变化后的饱和光电流与之前的饱和光电流之比为 $I_{S2}:I_{S1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ，电子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）
- 6.（本题 4 分）当波长为 300 nm 的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 $4.0 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a| = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ ；此金属的红限频率 $\nu_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Hz}$ 。
- 7.（本题 3 分）已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离，可用的最长波长的光是 91.3 nm 的紫外光，那么氢原子从各激发态跃迁至基态的赖曼系光谱的波长可表示为_____nm。
- 8.（本题 3 分）氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为_____。

二、推导证明题（共 6 分）

9.（本题 6 分）请推导：普朗克公式在长波极限和短波极限下分别趋向于瑞利金斯公式和维恩公式。

三、计算题（共 58 分）

10.（本题 8 分）假设太阳表面温度为 5800K，太阳半径为 $6.96 \times 10^8 \text{ m}$ ，如果认为太阳辐射是稳定的，求太阳在一年之内由于辐射，它的质量减小了多少？

11.（本题 10 分）钾的光电效应红限波长为 $0.62 \mu\text{m}$ ，求：

(1) 钾的逸出功；

(2) 在波长为 330 nm 的紫外光照射下，钾的遏止电压。

12.（本题 10 分）太阳可看成是半径为 $7.0 \times 10^8 \text{ m}$ 的球形黑体，太阳射到地球表面的辐射能量为 $1.4 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ ，地球与太阳的距离为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ ，试计算太阳的表面温度。

13.（本题 10 分）在加热黑体过程中，其单色辐射出射度的峰值波长由 $0.69 \mu\text{m}$ 变化到 $0.50 \mu\text{m}$ ，求总辐射出射度改变为原来的多少倍？

14.（本题 10 分）氢原子发射一条波长为 $\lambda = 4340 \text{ \AA}$ 的光谱线。试问该谱线属于哪一谱线系？氢原子是从哪个能级跃迁到哪个能级辐射出该光谱线的？（里德伯常量 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ）

15.（本题 10 分）用能量为 12.6 eV 的电子轰击氢原子，将产生哪些谱线？

四、设计应用题（共 6 分）

16.（本题 6 分）请同学根据下列条件及具体要求设计“发光波长在可见光范围内的激光器”。假设其原子的基态能级为 -13.6 eV ，激发态能级满足 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, $n = 2, 3, 4 \dots$ 。请利用所学的近代物理相关知识回答一下问题。（1）画出该原子的能级分布图；（2）计算给出在可见光范围内的，可能的谱线对应的波长。